

Bilaga 2

Rekommendationer för invasiva främmande arter

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya miljö börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Det är viktigt att invasiva arter inte breder ut sig på allmänningarna och tränger undan inhemska växter. Olika arter kräver olika åtgärder för att minimera spridningen. Vanligast är att slå eller gräva upp dem eller ta bort blomställningarna innan de har fått mogna frön. Tänk på att de flesta växters frön fortsätter att mogna efter slåtter så ta hand om blomställningarna när de tagits av.

OBS! att jordrester och växtdelar från tomterna inte får dumpas på allmänningarna för att minska spridning.

Arter med spridningsrisk som vi funnit på allmänningarna



Vresros - Rosa rugosa

Vresrosen är en medelstor buske som ofta planteras som häck eller buskage. Vresrosen sprids framför allt genom vegetativ förökning (rotskott). Arten sprids även genom dess frukter, nypon, gror. Bekämpning sker genom att växten grävs upp eller genom klippning runt rosen minskar risken för spridning.

Läs mer

<https://www.naturvardsverket.se/4ac5cc/globalassets/amnen/invasiva-frammande-arter/pdf/etablerade-vaxter-i-sverige/faktablad-vresros.pdf>



Canadensiska gullris - *Solidago canadensis*

Kanadensiskt gullris är en flerårig ört som kan bli upp till två meter hög. Den har mycket stor förmåga att sprida sig ut i naturen med hjälp av de vindspridda fröna. Den kan även breda ut sig via jordstammar och bilda stora täta och ogenomträngliga bestånd. Bekämpning slås före blomning och/eller grävs upp. Jord och växtrester bränns eller förs till återvinningsstation.

Läs mer

<https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/kanadensiskt-gullris/>



Blomsterlupin - *Lupinus polyphyllus*

Blomsterlupin är perenn och sprider sig med frön. Bästa sättet att begränsa den är genom uppgrävning. Man kan även begränsa spridningen genom att systematiskt plocka bort alla blomstjälkar innan fröna har mognat. OBS det räcker inte att slå av dem och låta dem ligga, fröna kan mogna även i avslaget tillstånd. Samla och bränn eller lämna in på återvinningsstation.

Lär mer

<https://www.naturvardsverket.se/4ac5b4/globalassets/amnen/invasiva-frammande-arter/pdf/etablerade-vaxter-i-sverige/faktablad-blomsterlupin.pdf>



Parkslide - *Reynoutria japonica*

Parkslide är en flerårig, storväxt, bambu-liknande ört. Den har ett grönt bladverk hela sommaren. Stjälkarna är grova, ihåliga och köttiga och sträcker sig två till tre meter över marken. Stammen är ljusgrön, förgrenad och med rödaktiga fläckar. När parkslide blir äldre blir dess stam tjock och vedartad. Parkslide blommar sent på säsongen och räknas till extra besvärliga arter. Oftast rekommenderas att göra ingenting

Läs mer

<https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/bekampning-och-hantering-av-parkslide/>



Parksallat - *Lactuca macrophylla*

Parksallat är en storväxt flerårig ört, som blir 100–150 centimeter hög. Bladen är kala, har en matt ljusgrön nyans och är glest parflikiga med en stor rundad flik vid bladskäftet. Parksallatens förmåga att sprida sig beror på att den har ett tätt rotsystem och bildar långa rotutlöpare som i sin tur skjuter nya skott. Så snart den har etablerat sig breder den ut sig snabbt och därtill sprider den sig även med frö. Därför är det först och främst viktigt att hindra fröspridning genom att slå av plantorna innan blomning. Om du gräver i parksallat stimuleras tillväxten, och skall därför undvikas.

Läs mer <https://for.se/vaxter-som-ar-en-potentiell-risk/parksallat/>



Torpspirea - *Spiraea* × *rosalba* och Häckspirea *Spirea salcifolia* med flera

Torpspirea med flera liknande arter och korsningar är en medelstor buske med rosa blommor i grenspetsarna. Sprider sig snabbt med rotskott när jordförhållanden är rätt. Vid spridning är uppgrävning är att rekommendera. Upprepad slåtter minskar spridningen. Bränn eller transportera till återvinningsstation.

Läs mer

<https://studylibsv.com/doc/809236/h%C3%A4ckspirea---%C3%B6rnsk%C3%B6ldsviks-kommun>



Snöbärsbuske - *Lactuca macrophylla*

Snöbär används som prydnadsbuske eller som häckväxt och når en höjd upp till två meter. Snöbär sprider sig med frö, men främst med rotfragment och rotutlöpare. För att bli av med snöbär frilägg rotsystemet innan stubben grävs bort. Lägga alla uppgrävda rhizomer på en presenning för att minimera risken för vidare spridning. Större bestånd eller en häck kan det vara bra att ta hjälp av en grävmaskin.

Läs mer <https://for.se/snobar/>

Version	Ändring	Datum	Av vem
1.0	Grundversion	2025-03-13	ÅO, ML